

Общеклинические исследования кала

1. Перед сдачей анализа **рекомендуется отменить лекарственные препараты** (все слабительные, препараты висмута, железа, ректальные свечи на жировой основе, ферменты и другие препараты, влияющие на процессы переваривания и всасывания).
2. Проведение анализа кала показано не ранее, чем **через 2 суток после клизмы, рентгенологического исследования желудка и кишечника, колоноскопии.**
3. Подготовить специализированный пластиковый контейнер с ложечкой, вмонтированной в крышку, для сбора кала. Контейнер можно получить у оператора лаборатории Скандинавского Центра Здоровья, либо приобрести его в аптеке.
4. Стул должен быть получен **без применения клизм и слабительных.**
5. Перед взятием материала на анализ необходимо провести тщательный туалет наружных половых органов и области заднего прохода, промыв их под душем с мылом.
6. Отобрать среднюю часть фекальной массы специальной ложечкой, вмонтированной в крышку контейнера для кала, в количестве, равном 1 грамму фекалий (примерно с горошину), и **герметично закрыть крышку.** При заборе материала следует избегать попадания мочи и отделяемого половых органов.
7. Хранение возможно при температуре от +2 до +8 °С до отправки в лабораторию **в тот же день.**
8. Доставить в Скандинавский Центр Здоровья и оформить сдачу анализа у оператора лаборатории.